



لُوغُول نيتوم

دواعي الاستعمال

محلول مخصّص لتحسين رؤية الشذوذات المخاطية أثناء الفحوصات التنظيرية.

الدواعي الرئيسية

- الكشف التنظيري عن سرطان الخلايا الحرشفية السطحي في المريء.
- الكشف بمنظار عنق الرحم عن شذوذات عنق الرحم (اختبار شيلر).
- يلون المحلول الخلايا الغنية بالجليكوجين.
- المناطق غير الملونة قد تشير إلى آفات مشتبه بها

طريقة الاستعمال

للاستعمال في التنظير وتنظير المهبل فقط

- التنظير: رشّ المحلول عبر قنطار الرذاذ، بعد أقصى ٢٠ مل
- تنظير المهبل: تطبيق موضعي باستخدام ضمادة مبللة بالمحلول

بعد الاستخدام :

- التخلص من أي كمية متبقية
- عدم إعادة الاستخدام مع مريض آخر

- عدم الحقن
- عدم البلع

لُوغُول نيتوم (التركيب لكل 100 مل)

- يود ٢,١ غ
- يوديد البوتاسيوم ٤,٢ غ
- ماء للحقن بكمية كافية لإتمام الحجم إلى ١٠٠ مل

الجرعة

- تنظير المريء: ١ إلى ٢ أمبولات
- الكولبوسكوب: أمبولة واحدة

اليود

يوديد البوتاسيوم

ماء الحقن

- عامل ملون ذو خصائص مطهرة
- يرتبط بالجليكوجين الموجود في الخلايا الظهارية.
- يساعد على كشف الشذوذات المخاطية.
- يُظهر المناطق غير الملونة التي قد تمثل آفات قبل سرطانية أو سرطانية.
- يسمح بإذابة اليود في الماء
- يثبت المحلول
- يضمن تورّعا متجانسا للمنتج
- مذيب معقم.
- يضمن النقاء والاستقرار الدوائي.

التحذيرات والاحتياطات

موانع الاستعمال

- خطر تشنج قصبي أثناء التنظير الهضمي (يجب تجنب الرشّ قرب فوهة المريء)
- للاستعمال مرة واحدة فقط
- عدم الاحتفاظ بالأمبولة بعد فتحها
- الحذر لدى المرضى المعرضين لخطر التحسس المفرط
- الحذر أيضًا لدى المرضى الذين يعانون من :
- نقص اليود
- التهاب الغدة الدرقية
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- استئصال درقي جزئي
- صغر السن
- لا يُستخدم في الحالات التالية:
- الحساسية تجاه اليود
- الحمل
- الرضاعة
- في حال الشك، يجب استشارة الطبيب.