

Nutrition Entérale Adulte

Fresubin® DB CONTROL



ISOCALORIQUE

Troubles
glycémiques



Nutrition complète par sonde **normoprotéinée isocalorique**. Pour les **besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition en cas de troubles du métabolisme glucidique**.

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, selon le règlement 128/2016.



Profil spécifique en glucides et fibres

- 66% des glucides sous forme d'amidon modifié
- 81% fibres solubles
- Service rendu suffisant, chez les patients dénutris ou à risque de dénutrition atteints de diabète de type 2 (avis CNEDiMTS 1^{er} septembre 2020, relatif au Fresubin® DB Control)



Index glycémique bas < 55



Une association de fibres solubles et insolubles pour assurer les fonctions essentielles qui contribuent au fonctionnement de l'intestin^{(3),(4)}



Profil lipidique (pour une poche de 500 ml)*

- 74% acides gras mono-insaturés*
- 16% acides gras polyinsaturés (dont oméga 3)*
- 10% acides gras saturés*
- Un ratio ω6/ω3 de 3




Osmolarité proche de l'osmolarité physiologique (300 mosm/l)

Permet une bonne absorption de la solution de nutrition entérale⁽¹⁾
Améliore la tolérance gastro-intestinale à la nutrition entérale⁽²⁾



EasyBag®, une poche unique° et innovante pour simplifier le quotidien

- **Connexion rapide** : après ouverture trocarter directement sur la poche en suspension
- **Écoulement intégral du contenu** : forme entonnoir
- **Risque de fuite ou de contamination réduit** : valve anti-reflux
- **Sécurité renforcée** : ailettes d'ouverture non repositionnables (témoin d'ouverture de la poche)
- Une poche **visible, lisible, colorée et distincte**



Pour 500 ml :

- **500 kcal et 22,5 g de protéines**
- **Avec fibres** (81% solubles / 19% insolubles)
- 66% des glucides sous forme d'amidon modifié

- **Stérilisé**
- **Sans lactose, sans gluten**
- **Profil vitaminique et minéral complet**
- **Conditionnement** : poche EasyBag® de 500 ml
- **Conditionnement cartons** : 15 poches/carton

* de l'apport lipidique total. ° à ce jour 14/11/2025.



Informations nutritionnelles

Analyse moyenne		pour 100 ml	par unité 500 ml
ÉNERGIE	kcal (kJ)	100 (418)	500 (2090)
LIPIDES (45% AET)	g	5	25
A.G. Saturés	g	0,5	2,5
dont TCM	g	-	-
A.G. Mono-insaturés	g	3,7	18,5
A.G. Polyinsaturés	g	0,8	4
dont oméga 3	g	0,2	1
dont EPA - DHA	g	0,17	0,85
dont acide linoléique	g	0,62	3,1
dont acide alpha-linolénique	g	0,01	0,05
Rapport ω6/ω3		3	
GLUCIDES (32% AET)	g	8,1	40,5
Sucres	g	2,4	12
dont lactose	g	≤ 0,2	≤ 1
dont fructose	g	2,2	11
dont amidon modifié	g	5,4	27
FIBRES (5 % AET)	g	2,5	12
dont fibres solubles	%	81	81
dont fibres insolubles	%	19	19
PROTÉINES (18% AET)	g	4,5	22,5
Azote	g	0,7	3,5
Sel	g	0,21	1,05
Teneur en eau	ml	83	415
Osmolarité	mosmol/l		270
Viscosité mesurée	mPa.s		20-45
MINÉRAUX			
Sodium	mg	85	425
Potassium	mg	143	715
Chlorures	mg	124	620
Calcium	mg	88	440
Magnésium	mg	31	155
Phosphore	mg	59	295
Fer	mg	1,5	7,5
Zinc	mg	1,3	6,5
Cuivre	mg	0,15	0,75
Manganèse	mg	0,3	1,5
Iode	µg	14,8	74
Fluor	mg	0,15	0,75
Chrome	µg	30	150
Molybdène	µg	11	55
Sélénium	µg	7,4	37
VITAMINES			
Vitamine A	µg RE	200	1000
Dont β-carotène	µg RE	122	610
Vitamine D3	µg	1,1	5,5
Vitamine E	mg α-TE	7,4	37
Vitamine K1	µg	7,4	37
Vitamine B1	mg	0,15	0,75
Vitamine B2	mg	0,19	0,95
Niacine	mg (mg NE)	1,8 (2,8)	9 (14)
Vitamine B6	mg	0,18	0,9
Vitamine B12	µg	0,3	1,5
Acide pantothénique	mg	0,52	2,6
Biotine	µg	5,6	28
Acide folique	µg	29,6	148
Vitamine C	mg	19	95
AUTRES COMPOSANTS			
Choline	mg	40,7	203,5
Extrait de thé vert	mg	30	150
Caféine	mg	3,3	16,5
DONNÉES			
PHYSICOCHIMIQUES			
N/kcal totales		1/136	
N/kcal glucido lipidique		1/111	

EPA : acide eicosapentaénoïque - DHA : acide docosahexaénoïque. TCM : Triglycérides à Chaînes Moyennes - AET : Apports Énergétiques Totaux. - AG : Acides Gras

*Pour une même gamme de produits

** Site d'Emmer Compascuum

Précautions d'utilisation

Avis important

Doit être utilisé sous contrôle médical. Contrôler le débit d'administration. Augmenter lentement le débit en début de réalimentation. Peut être utilisé comme seule source d'alimentation. Ne convient pas à l'enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. Contient de la caféine (3,3 mg/100 ml). Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique adapté. Le traitement médicamenteux prescrit pour le contrôle de la glycémie devra être adapté en conséquence. Ne pas utiliser par voie parentérale. Stérilisé. Peut présenter une sédimentation de minéraux, de couleur plus ou moins foncée. Ces sédiments peuvent être facilement dissous en agitant la poche. Ceci n'affecte ni la composition ni les qualités microbiologiques et nutritionnelles du produit.

Utilisation

Conserver et administrer à température ambiante (15-25°C). Après ouverture, la poche connectée à la tubulure doit être utilisée dans les 24 heures. Agiter avant utilisation. Vérifier l'intégrité du conditionnement et l'aspect du produit. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Ingrédients

Eau, amidon modifié, huiles végétales (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, huile de carthame), caséinate de sodium (issue du lait), fructose, protéines de lait, huile de poisson, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), fibres de cellulose, maltodextrine, chlorure de potassium, arômes, stabilisants (E 460, E 452, E 466), citrate de potassium, bitartrate de choline, carbonate de calcium, vitamine C, oxyde de magnésium, correcteur d'acidité (E 524), chlorure de sodium, extrait de thé vert (0,03 %), vitamine E, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, β-carotène, acide pantothénique, thiamine, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Les ingrédients allergènes sont soulignés dans la liste d'ingrédients conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires en vigueur. (Règlement information du consommateur n°1169-2011 du 25 octobre 2011).

Données environnementales Easybag®

Réduction de 62% de poids de plastique utilisé comparé aux bouteilles concurrentes sur le marché européen* → pour une volumétrie de déchets moindre⁵.

Un site** de production engagé à travers 2 certifications ISO (14001 et 50001).

Un conditionnement par 15 poches pour optimiser le nombre de cartons utilisés.

Poche plate pour une réduction du volume des déchets, notamment au domicile, et lors du transport⁵.

(1) Standards, Options et Recommandations (SOR). Bonnes pratiques pour la prise en charge diététique en cancérologie : la nutrition entérale. Avril 2005. (2) Blumenstein I, Shastri YM, Stein J. Gastroenteric tube feeding: techniques, problems and solutions. World journal of gastroenterology: WJG. 2014;20(26):8505. (3) Les fibres alimentaires : Déterminants physico-chimiques, définition, aspects analytiques et physiologiques Bodé J-Chret al. Cah. Nutr. Diét., 40, 1, 2005 (4) Reduction in diarrhea incidence by soluble fiber in patients receiving total or supplemental enteral nutrition, H.Homann, Journal of parenteral and enteral nutrition (5) Multi-Layer Packaging for Enteral Nutrition Products. An Environmental and Waste Perspective- Andreas Dtzet, ifeu-Heidelberg (institute for Energy and Environmental Research), 2020.

Déclarer un effet indésirable : qualite_nutrivigilance.fkf@fresenius-kabi.com

